

La MALALTIA D'AUJESZKY (MA):

- Causada per l'Herpesvirus porcí tipus I (família Herpesviridae, subfamília Alphaherpesvirinae).
- S'associa inicialment amb els suïds domèstics i salvatges (porcí i senglar, hibridacions d'aquests), que són els seus hostes naturals on el virus pot acantonar-se després de la recuperació clínica. Per tant, l'espècie porcina és l'única capaç de superar una infecció, depenent de l'edat i estat immunitari. Els porcs i senglars poden ser reservoris de la MA.
- En altres espècies susceptibles (carnívors,...) la malaltia és mortal. No és una zoonosi.
- En gossos no és de declaració obligatòria (no MDO) però sí que té interès epidemiològic i requereix descartar ràbia (sí MDO).

SIMPTOMATOLOGIA EN GOSSOS

El virus es transmet als gossos quan s'alimenten amb restes de senglars infectats o per contacte directe en l'enfrontar-se o mossegar/ingerir fluids dels cadàvers. Situació especialment arriscada en gossos de cacera.

Període d'incubació és de 2 a 7 dies, la mort es produeix en poques hores (<48h) des de l'aparició dels primers símptomes. El virus no es transmet entre gossos.

Símptomes clínics més característics:	Pruija (picor intensa), sobretot facial sialorrea signes neurològics (atàxia, espasmes musculars)	diarrea hemorràgica edema vòmits dispnea
---------------------------------------	---	---

PREVENCIÓ

- Evitar alimentar els gossos amb restes crues i també cal eliminar adequadament les despulles de les caceres, impedit que els gossos que hi participen puguin arribar a ingerir-los. Evitar o minimitzar el contacte directe dels gossos amb senglars.
- Existeix actualment una vacuna però únicament es aplicable a l'espècie porcina.

COM ACTUAR EN CAS DE SOSPITA

En tots els casos cal descartar primer la infecció pel virus de la ràbia.

1. Quan un veterinari clínic tingui clares sospites de MA (gossos de cacera, en contacte amb senglar,...)
2. Comunicar el cas al Servei de Sanitat Animal (SSA): enviant per correu electrònic a l'adreça: sanitatanimal.agricultura@gencat.cat, adjuntant la fitxa de comunicació que s'obre fent doble clic a l'enllaç següent: 
3. S'han de comunicar totes les dades sol·licitades de què es disposi, a part de qualsevol altra informació que pugui ser rellevant.
4. Durant la manipulació de l'animal es prendran totes les mesures de bioseguretat per minimitzar el risc de potencials contagis. El cadàver es mantindrà preferentment en refrigeració; quan això no sigui possible i no es pugui traslladar immediatament al laboratori, s'acordarà la congelació amb el SSA.
5. El SSA gestionarà la recollida del cadàver i es posarà en contacte amb la clínica per gestionar el trasllat del gos al laboratori de l'IRTA-CReSA.
6. Abans de descartar la MA, des de l'IRTA-CReSA es remetran mostres de teixit al **Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III** per descartar el virus de la ràbia.
7. El SSA enviarà els resultats de les anàlisis realitzades al clínic veterinari que va fer la comunicació.