



ESCRIT INFORMATIU ADREÇAT ALS GOSSERS I CAÇADORS SOBRE MESURES DE BIOSEGURETAT DAVANT LA PESTA PORCINA AFRICANA (PPA)



PREPARACIÓ I MANEIG DELS GOSSOS ABANS DE LA SORTIDA.

Benvolguts gossers i caçadors,
Davant el risc creixent d'introducció i disseminació de la Pesta Porcina Africana (PPA) a Catalunya, i amb l'objectiu de protegir la fauna silvestre, la cabana porcina i l'activitat cinegètica a Catalunya, és imprescindible extremar les mesures de bioseguretat abans, durant i després de les jornades de caça.

1. OBLIGACIONS DELS GOSSERS

NETEJA I DESINFECCIÓ DELS VEHICLES:

- Netejar a fons el remolc o vehicle on es transportin els gossos després de cada sortida de caça.
- Eliminar completament fang, restes orgàniques, sang o qualsevol material potencialment contaminat.
- Aplicar desinfectants autoritzats d'ús ramader o cinegètic.
- Prestar especial atenció a rodes i parafangs.



NETEJA DELS GOSSOS:

- Rentar els gossos en finalitzar la jornada.
- Evitar que accedeixin a zones o instal·lacions sense haver estat degudament rentats.

CONTROL DEL MATERIAL DE TREBALL:

- Desinfectar collars, corretges, i material de maneig.
- Separar el material net del brut per evitar contaminacions creuades.



2. MESURES PER AL PROPI CAÇADOR

- Canviar-se la roba i el calçat després de la jornada.
- Rentar la roba de caça a temperatures altes.
- Mantenir un calçat exclusiu per a la caça.
- No transportar restes de senglar entre municipis.



3. RECOMANACIONS GENERALS PER A TOTS ELS CAÇADORS

- Evitar desplaçar-se amb vehicles o gossos sense una neteja prèvia.
- Extremar la precaució en zones amb sospita o confirmació de PPA.
- Mantenir-se informat a través dels canals oficials.
- Notificar qualsevol troballa de senglar mort o malalt.

4. COMPROMÍS COL·LECTIU

La caça és clau en la vigilància i control de malalties de la fauna salvatge. La implicació dels gossers i caçadors és essencial per evitar que la PPA arribi o s'escampi al territori català. La responsabilitat i la rigorositat en l'aplicació d'aquestes mesures són fonamentals per protegir la fauna i el sector porcí de Catalunya.

Agraïm la vostra col·laboració i compromís.



FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA.



¿Qué es la Peste Porcina Africana?

Es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a jabalíes y cerdos domésticos causada por un virus de la familia Asfarviridae.

Hay cepas que pueden provocar cuadros agudos o híperagudos con niveles de mortalidad y morbilidad próximos al 100%.

Otras cepas cursan cuadros clínicos subagudos o incluso crónicos con menor mortalidad

PESTE PORCINA AFRICANA ¡MÁXIMA ALERTA!

Proteja a nuestros animales, evite que la Peste Porcina Africana entre en España



Lave en profundidad ropa y calzado para eliminar cualquier resto de materia orgánica:

- Lavado largo con agua entre 60° y 80° C, con detergentes para la ropa (o Nonidet P-40, desoxicolato o saponina)
- Cepille muy bien las botas, sobre todo las juntas y las ranuras de las suelas, con agua caliente y jabón

2

Tras el lavado, desinfecte la ropa:



- Con dióxido de cloro a 200 ppm
- Con ácido cítrico 0,2% (2 g/l)
- Entre 10 y 30 minutos

3

Espere un mínimo de 72 horas para volver a utilizar la ropa y el calzado en el campo



4

Notificación de casos de mortalidad a normales a las autoridades veterinarias competentes

5

Trofeos

- Desinfección de trofeos:

- Inmersión en agua hirviendo hasta eliminar toda materia que no sean huesos y dientes
- Remojo en solución de sosa comercial (carbonato sódico) al 4%, mantenida a un pH superior a 11,5 durante 48 horas
- Remojo en solución de ácido fórmico (100 kg sal y 12 kg de ácido fórmico por 1.000 litros de agua), a un pH inferior a 3,0. Al menos 48 horas
- Cueros crudos: salazón con sal marina con un 2% de sosa comercial al menos 28 días, o con formol al 1% durante una semana

- Documentación:

Certificado que garantice que los subproductos animales y productos derivados se manipulen de conformidad con el reglamento SANDACH

